

Рецензия

на проект клинических рекомендаций

«Аnestезиологическое обеспечение переломов проксимального отдела бедренной кости у пожилых и престарелых пациентов».

На рецензию представлен проект клинических рекомендаций «Аnestезиологическое обеспечение переломов проксимального отдела бедренной кости у пожилых и престарелых пациентов», подготовленный рабочей группой специалистов ведущих российских медицинских учреждений, занимающихся неотложной помощью травматологическим пациентам.

1. Представленные клинические рекомендации воспринимается однозначно, понятны врачам-специалистам и не содержат положений, допускающих иные толкования.

2. Актуальность разработки клинических рекомендаций обусловлена повышением средней продолжительности жизни населения, сопровождающимся выраженным ростом частоты переломов проксимального отдела бедренной кости. Известно, что переломы проксимального отдела бедренной кости существенно повышают риск смерти пожилых и престарелых пациентов. Для снижения смертности и улучшения результатов реабилитации пациентов необходимо следовать современным и обоснованным подходам к лечению, которые систематизированы и представлены в настоящих клинических рекомендациях.

3. В представленных клинических рекомендациях в удобной и понятной для практического врача форме отражены все основные этапы диагностических и лечебных мероприятий в периоперационном периоде у пожилых пациентов с переломом проксимального отдела бедренной кости. Исполнение данных клинических рекомендаций на региональном уровне способно повысить качество оказания медицинской помощи больным с переломом проксимального отдела бедренной кости.

4. Литература по рекомендациям представлена достаточно полно, список литературы включает основные отечественные и зарубежные источники, данные изложены адекватно.

5. Краткое изложение доказательств и заключений приемлемо для решения поставленных задач.

6. Клинические рекомендации не содержат непроверенных или неадекватных заключений, так как основаны на современных, принятых в международной практике принципах лечения переломов проксимального отдела бедренной кости у пожилых пациентов. Рекомендацию о проведении оксигенотерапии в послеоперационном периоде целесообразно дополнить – в целях поддержания SpO₂ в пределах 90-95%.

7. Клинические рекомендации могут быть рекомендованы для использования в отделениях травматологии-ортопедии и отделениях анестезиологии-реанимации врачами-специалистами для качественного оказания специализированной медицинской помощи.

8. Оформление представленных клинических рекомендаций соответствует ГОСТ Р 56034-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Клинические рекомендации (протоколы лечения).

Заведующий кафедрой

анестезиологии и реаниматологии

ФГБОУ ВО «Северный государственный
медицинский университет» МЗ РФ (Архангельск),

д.м.н., профессор



Киров М.Ю.

Доцент кафедры

анестезиологии и реаниматологии

ФГБОУ ВО «Северный государственный
медицинский университет» МЗ РФ (Архангельск),

д.м.н.

Борисов

Борисов Д.Б.

6.10.2016